

ドライアイ IPL治療

- ・マイボーム腺機能不全を改善する画期的な治療法です。
- ・症状によりますが、3~4週間おきに4回ほど実施すると高い効果が期待されます。
- ・ダウンタイム（施術後の制限）は基本的にはありませんが、施術後は紫外線対策が必要です。



施術料

1回 8,800円

(カウンセリング料・診察代込み)



ドライアイIPL治療とは

最新の研究で、ドライアイ症状に「マイボーム腺機能不全（MGD）」が影響していることが分かってきました。

ドライアイIPL光線治療は、まぶたにIPLという光を照射することで、マイボーム腺の詰まり・炎症を改善し、涙の「油不足」を解消していきます。


目薬では改善しにくいドライアイにも効果が期待されています。



マイボーム腺機能不全(MGD)とは

涙は、油分・水分・ムチンの層からできており、水分が蒸発しないように、表面に一層薄く油層がのっています。その油を分泌しているのが、まつ毛の生え際にあるマイボーム腺です。

このマイボーム腺の働きが、なんらかの原因で低下してしまう病気を、マイボーム腺機能不全 (Meibomian Gland Dysfunction, MGD) といいドライアイ症状や眼不快感が引き起こされます。






こんな症状の方におすすめです！

- 寝起きに目がしょぼしょぼする方
- コンタクトが長時間つけられない方
- パソコンやスマートフォンの使用が長い方
- 点眼をまめに使用しても乾きを感じる方
- 眼の手術のあと違和感が続く方
- 目がごろごろする、目脂（目ヤニ）が出ている感じがする（眼異物感）
- まぶたが熱い（眼灼熱感）
- 目が痛い（眼痛）、目の疲れ（眼精疲労）
- 涙が出る（流涙感）



施術の流れ



- ① 診察。
- ② 洗顔。メイクを落としていただきます。
- ③ 照射部位にジェルを塗ります。
- ④ 照射。
- ⑤ ジェルを拭き取りとり洗顔、保湿をしていただきます。
- ⑥ 診察室に移動し、マイボーム腺の圧出を行い終了となります。

